

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialis


IV


(18 Août 1941)

MOULINS

"LES IMPRIMERIES RÉUNIES"

15, RUE D'ENGHIEN, 15





SciELO/MZUSP

Le présent fascicule contient des nouveautés en *Coléoptères* paléarctiques (pour commencer), ou exotiques dont les *types* se trouvent dans ma collection. Les désignations des familles sont mises en abrégé. Les fascicules de *Op. martialis* sont en vente chez l'auteur.

Haplocnemus Caroli n. sp. [Malac.]. Oblongus, nitidus, albo et fusco pilosus, nigro-cuprescens, membris piceis, tibiis pro parte tarsisque rufescentibus; antennis brevibus, articulo 3° elongato, cœteris subtriangularibus; thorace breve et lato, lateraliter arcuato et vage crenulato, sparse pupillato-punctato; elytris latis, sat brevibus, apice paulo attenuatis, late non dense punctatis, ad suturam longitudinaliter subimpressis. Long. 5,5 mill. Maroc. — A placer près de *cribrosus* Schils, plus robuste avec les membres plus foncés.

Elodes minuta L. [Elod.]. Les deux var. françaises qui suivent sont à nommer: *var. discicollis*, à disque du thorax rembruni; *var. Theresæ*, à élytres largement foncés à l'extrémité avec une macule triangulaire prescutellaire foncée. Cette dernière var. se rapproche de la *v. prescutellaris* Pic, de Macédoine, qui a une longue bande prescutellaire foncée.

Sinaptus filiformis F. [Elat.]. Deux variétés nouvelles de coloration générale foncée sont à distinguer nominativement: *var. atripes*, des Guerreaux, à pattes noires avec le thorax marqué de testacé de chaque côté de son bord antérieur; *var. Leprieuri*, de Colmar, ayant le thorax complètement bordé de testacé en avant avec les membres d'un brun roussâtre.

Strangalia 4-fasciata v. *nov. martialis*. [Cer.]. Fascia nigra basalis elytrorum ad humeros prolongata, fascia prebasalis nigra in singulo biinterrupta, fascia mediana

ad suturam oblitterata. France : Les Guerreaux (Pic). — Voisine de la *var. abbreviata* Gab.

Anthonomus rectirostris v. nov. **interruptus**. [Cur.]. Fasciis brunneis elytrorum diverse interruptis. Les Guerreaux (Pic).

Balaninus pilosus v. nov. **Fauconneti**. [Cur.]. Niger, rostro apice, pedibus pro parte elytrisque rufis. Autun.

B. pellitus v. nov. **multinotatus**. Pro parte griseo pubescens, elytris multi fulvo maculatis, maculis aliquot pro parte junctis. Algérie : Yakouren (Pic) et France M^{le}. — Le revêtement de la forme typique (ex description) est presque entièrement cendré.

Spermophagus diversipes n. sp. [Bruc.]. Oblongo-subovatus, fere uniformiter griseo pubescens, minute et dense punctatus, niger, antennis ad basin, pedibus 4 anticis (tarsis obscuris) abdomineque rufis. Long. 3 mill. Madagascar. — Se distingue de *hottentotus* Fahr. et voisins par l'abdomen roux.

Pelochrops madecassus n. sp. [Clav.]. Grandis, oblongus, antice et postice paulo attenuatus, nitidus, mediocre pubescens, niger ; thorace breve, valde transverso, sat minute et sparse punctato ; scutello grande, triangulare ; elytris lateraliter, subarcuatis et postice attenuatis, marginatis, pro majore parte fortiter non dense, pro parte irregulariter punctatis. Long. 3 mill. Madagascar. — Espèce caractérisée par sa grande taille, pour le genre, et son aspect peu pubescent.

Limnichus rufimembris n. sp. [Clav.]. Minutus, oblongus, postice attenuatus, subconvexus, griseo-holosericeo pubescens, minute et dense punctatus, rufus, supra brunnescens, membris rufis, antennis apice brunneis. Long. 1,5 mill. Madagascar. — Diffère de *brevior*

Frm. par la ponctuation moins forte des élytres, leur pubescence étant plus fine et plus couchée.


Cyphon signatipenne n. sp. [Elod.]. Oblongo-subelongatus, postice valde attenuatus, sparse griseo pubescens, nitidus, rufus, antennis apice nigris, elytris rufis, apice pallidioribus, in singulo ante et post medium late piceo-maculatis, maculis externe junctis, his mediocre non dense punctatis. Long. 2,5 mill. Brésil. — Très distinct de *Plaumani* Pic par sa forme plus atténuée au sommet avec une coloration particulière.

C. Achardi n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo attenuatus, sparse griseo pubescens, nitidus, rufus, elytris apice membrisque pallidioribus, oculis nigris ; elytris ad suturam antice paulo impressis. Long. 2,5 mill. Guyane. — Distinct de *Humberti* Pic par la forme non subovale, la taille plus avantageuse, la ponctuation moins fine sur l'avant-corps.

C. corumbanum n. sp. du Brésil, de coloration générale testacée, a une forme intermédiaire entre *Humberti* Pic et *Achardi* Pic, oblongue-subovale, l'avant-corps est finement ponctué, le thorax, pas très court, est subarqué sur son milieu antérieur, les élytres ont une ponctuation en partie fine et espacée et sont dépourvus d'impression suturale nette.

Scirtes semicinctus n. sp. [Elod.]. Subovatus, griseo pubescens, nitidus, rufus, capite pro majore parte piceo, elytris ad basin piceo maculatis, lateraliter postice late et elongate piceo notatis ; capite thoraceque minute sat dense punctatis ; elytris sat fortiter non dense punctatis. Long. 3 mill. Mexique. — Se distingue de *4-notatus* Chp. par le thorax et l'écusson concolores clairs, les dessins noirs des élytres différents.

Lema angusticollis n. sp. [Phyt.]. Oblongus, testa-



ceus, elytris post medium reducte et arcuate nigro fasciatis, infra humeros externe minute brunneo notatis, antennis nigris, articulo 1° rufescente, tarsis pro parte brunneis ; thorace angustato, paulo strangulato ; elytris antice fortiter punctatis, postice striatis et costatis. Long. 5 mill. Brésil. — Espèce très caractérisée par son thorax étroit et la forte sculpture des élytres.

L. fortesculpta n. sp. Oblongo-parallelus, testaceus, capite pro parte, thorace lateraliter pectoreque nigris, elytris testaceis, antice linea prelateralis nigra ornatis et apice nigro maculatis, his fortiter lineato-punctatis, apice costulatis. Long. 4,5 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

L. externenotata n. sp. Oblongo-parallelus, rufus, antennis, geniculis, tibiis apice tarsisque nigris, elytris ad humeros et ante apicem externe nigro maculatis, antice impressis, fortiter lineato-punctatis. Long. 5 mill. Brésil.

L. Anceyi n. sp. Oblongus, postice attenuatus, rufus, antenis, articulo 1° excepto, geniculis, tibiis apice tarsisque nigris, elytris ad humeros nigro maculatis, his antice arcuate impressis, diverse lineato-punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

L. hansaensis n. sp. Oblongo-parallelus, niger, thorace, antennis apice femoribusque pro majore parte testaceis, elytris nigro-cyaneis, ad medium late, ad apicem oblique testaceo fasciatis, sutura apice cyanea. Long. 8 mill. Brésil. — A placer près de *Championi* Jac.

L. Patinoi n. sp., de Munijales, voisin du précédent, est un peu moins élargi, l'abdomen et les cuisses sont entièrement testacés, la suture n'est pas foncée à l'extrémité et la bande est un peu éloignée du bord. La var. nov. *v-notata* a les dessins foncés des élytres noirs à peine bleutés et la partie postérieure de la bande est envahie par deux petites lignes jaunes formant un V.

L. ruficeps n. sp. Oblongus, parum curtus, rufus et testaceus, pectore nigro, elytris, lateraliter excepto, ad basin et ad medium sat late nigro-cyaneo fasciatis. Long. 5 mill. Mexique. — Diffère de *solani* F. par la tête rouge et les élytres largement clairs à l'apex.


L. viridifasciata n. sp. Oblongus, sat latus, rufus et testaceus, capite, collo excepto, et pectore nigris, elytris lateraliter, ad humeros excepto, et pro majore parte testaceis, ad basin sinuate, post medium subarcuate viride fasciatis. Long. 6 mill. Mexique. Plus robuste que le précédent avec la tête foncée.

L. postreducta n. sp., du Mexique, a la bande basale plus courte, nettement biéchancrée postérieurement et non prolongée subanguleusement sur la suture, il n'a postérieurement qu'un petit trait transversal foncé.

L. mediomaculata n. sp. Minutus, robustus, capite, pectore, tibiis tarsisque nigris, thorace rufo, antennis, ad basin excepto, abdomine femoribusque testaceis, elytris testaceis, ad basin, lateraliter excepto, nigro-viride fasciatis, fascia ad suturam paulo prolongata, his ad medium et ad suturam viride maculatis (*forma typica*), aut ad medium immaculatis (*v. viridibasis*). Long. 4,5 mill. Guatemala. — Très caractérisé par sa petite taille robuste jointe à la coloration élytrale.

L. uniarcuata n. sp. Oblongo-subovalis, testaceus, capite, pectore lateraliter nigris, tibiis pro parte brunneis, elytris intus ad basin arcuate semiannulate, post medium transverse reducte nigro-metallico fasciatis. Long. 5 mill. Colombie. — A placer près de *hamata* Lac.

L. basidivisa n. sp., de Bogota, un peu plus grand et plus parallèle que le précédent, a la poitrine largement foncée, les dessins élytraux un peu verdâtres et différents, faits d'une sorte de lunule basale interrompue en



avant et près de la suture en arrière, avec, sur chaque, une macule discale postmédiane arrondie et un petit trait sutural commun, près des macules.

L. subarcuata n. sp. Oblongo-subparallelus, rufus aut testaceus, capite, collo excepto, antennis pro majore parte, scutello, pectore, tibiis tarsisque nigris, elytris testaceis, signaturis viridibus in singulo notatis ; linea communis suturalis reducta, linea humeralis paulo longiora, ad humeros dilatata, macula transversa discoidalis antemediana, fascia reducta, angustata et arcuata, submediana. Long. 8 mill. Bogota. — Très caractérisé par les dessins particuliers des élytres.

L. mirabilis n. sp. Oblongo-elongatus, rufus et testaceus, capite, antennis, apice excepto, scutello pectoreque nigris, elytris testaceis, in singulo signaturis nigro-viridibus signatis : linea basalis communis reducta, linea prelateralis ad basin ultra medium, postice angustata, macula discoidalis postmediana. Long. 7-7,5 mill. Bolivie. — Diffère de *trivirgata* Lac. par les antennes et le cou foncés, la bande suturale courte.

L. diversenotata n. sp., du Brésil, a le 1^{er} article des antennes roux, les dessins des élytres noirs métalliques, les antérieurs étant différents avec une macule humérale subtriangulaire et une ligne suturale étroite, un peu élargie autour de l'écusson et ne dépassant pas le milieu.

L. Germaini n. sp. Oblongo-subovalis, rufus aut testaceus, capite pro parte pectoreque nigris, elytris diverse nigro-metallico lineatis : linea angusta suturalis sat elongata, linea prelateralis post medium paulo prolongata, linea reducta postmediana discoidalis. Long. 6 mill. Bolivie. — Voisin de *5-maculata* Lac., ainsi que les espèces suivantes.

L. Gounellei n. sp. Sat elongatus, subparallelus, rufus

et testaceus, capite, antennis, apice excepto, scutello pectoreque nigris, elytris testaceis, diverse nigro-metallico signatis : linea angusta suturalis sat elongata, linea prelateralis antice intus furcata, ante apicem evanescens, macula postmediana discoidalis. Long. 7 mill. Brésil.

L. subexclamationis n. sp., du Brésil, de coloration analogue au précédent, n'a pas la bande prélatérale fourchue à la base, le thorax a une très petite macule noire devant l'écusson, la macule discale des élytres est transversale, les antennes sont marquées de roux à la base.

L. metallicosuturalis n. sp. Oblongo-elongatus, rufus et testaceus, capite, antennis pro parte, scutello pectoreque nigris, thorace rufo, elytris testaceis, signaturis viridibus ornatis : linea angusta suturalis sat elongata, ad humeros dilatata, linea prelateralis angusta ante apicem evanescens. Long. 7-8 mill. Bolivie. — A placer près de *cæruleolineata* Jac., qui a le thorax foncé.

L. inexclamationis n. sp., du Brésil, voisin du précédent, est subparallèle, les antennes sont moins longues et plus largement rougeâtres, non grêles, les lignes sont noirâtres, à peu près d'égale longueur et s'arrêtent peu loin de l'extrémité.

L. reductesuturalis n. sp., du Brésil, voisin du précédent, a l'abdomen en partie foncé et se distingue, à première vue, par la bande suturale assez largement oblitérée vers la base.

L. semisepta v. nov. *impunctata*. Linea discoidalis elytrorum oblitterata. Brésil.

L. abrupta v. nov. *ininterrupta*. Linea discoidalis elytrorum non interrupta, sinuata, ante apicem evanescens. Mexique.

L. bilineata v. nov. suturalis. Elytris testaceis, ad suturam nigro lineatis, linea apice paulo dilatata. Montevideo.

L. fasciaticollis n. sp. Minutus, sat latus, rufus, capite, antennis, scutello, pectore pro parte pedibusque nigris, femoribus posticis pro parte rufis, thorace rufo, postice in sulco nigro fasciato, elytris rufis, late nigro vittatis : linea suturalis apice dilatata, linea prelateralis lata ante apicem evanescens. Long. 5,5 mill. Bogota. — A placer près de *bilineata* Germ. et caractérisé par la fascie noire du thorax.

L. prelateralis n. sp. Oblongus, minutus, rufus et testaceus, capite pro parte, antennis, articulo 1° rufo, his latis, scutello, pectore lateraliter, tibiis apice tarsisque nigris, elytris testaceis, lineis nigris ornatis : linea suturalis et linea prelateralis ante apicem evanescentibus. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin de *bivittata* Lac.

L. latevittata n. sp., du Brésil, voisin du précédent, est roux, avec les antennes, l'écusson et les pattes en majeure partie noires, les cuisses sont flaves à la base, les élytres flaves ont une bande suturale complète et une large bande discale arrêtée avant le sommet, celles-ci noires.

L. brevehumeralis n. sp. Minutus, latus, rufus, capite, antennis, scutello pectoreque nigris, thorace rufo, medio obscuro, elytris testaceis, signaturis nigris ornatis : linea suturalis angusta ante apicem evanescens, macula humeralis elongata, linea lateralis reducta. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

L. infenestrata n. sp. Oblongus, sat latus, rufus et testaceus, capite, antennis, apice excepto, scutello pectoreque nigris, elytris testaceis, ad basin, lateraliter excepto,



cyaneis, fascia basalīs in disco, longe interrupta et lateraliter postice anguste prolongata, post medium, lateraliter excepto, cyaneo fasciatis. Long. 6 mill. Colombie. — Espèce caractérisée par le dessin basal particulier des élytres, présentant une ligne claire qui s'avance dans la partie foncée.

L. intermedia v. nov. **Augustalisi**. Linea suturalis, apice non dilatata. Brésil.

L. latemarginata n. sp. Oblongus, parum latus, rufus, elytris, ad suturam angustiore, nigro-cyaneo marginatis, antice paulo impressis et mediocre punctatis, antennis nigris, articulo 1° rufo, pedibus nigris, femoribus ad basin rufis. Long. 4 mill. Brésil. — Diffère de *tæniata* Bat., au moins par le dessous du corps roux.

L. maculipes n. sp. Oblongus et latus, testaceus, capite in vertice uni et thorace bi nigro maculatis, elytris ad suturam et in disco late nigro vittatis, ad apicem nigro maculatis, sat fortiter striato-punctatis, infra corpore lateraliter nigro notato, antennis nigris, pedibus nigris, tibiis ad basin testaceis, femoribus testaceis, nigro maculatis. Long. 5 mill. Tucuman. — Peut se placer près de *bilineata* Germ.

L. latipennis n. sp., du Tucuman, par sa forme, se rapproche du précédent, mais les élytres sont un peu plus longs, la coloration est entièrement foncée, noire, avec les élytres un peu bleutés.

L. bisbinotata n. sp. Oblongus, rufo-testaceus, antennis in medio et capite ad oculos nigris, elytris ad humeros et post medium in disco nigro maculatis, his paulo impressis, sat fortiter punctatis. Long. 5 mill. Tucuman. — Voisin du précédent. La *var. uninotata* a les antennes plus foncées, deux macules brunes au thorax et les épaules seulement marquées de foncé.

L. latebifasciata n. sp. Oblongo-elongatus, niger, thorace rubro, femoribus pro parte elytrisque luteis, his ad basin et ante apicem, lateraliter excepto, late viride-cœruleo fasciatis, sutura postice nigra. Long. 6 mill. Tucuman; — A placer près de *elegantula* Jac.

L. Wagneri n. sp. Oblongus, sat latus, luteus, capite in vertice, thorace in disco nigro bimaculatis, elytris ad humeros et apice minute nigro maculatis, subconvexis, antennis, articulo 1° excepto, scutelloque nigris, pedibus luteis, genibus, tibiis apice tarsisque nigris. Long. 7 mill. R. Argentine. — A placer près de *Dugesi* Borre.

L. pardoensis n. sp., du Brésil, Voisin du précédent, a une coloration générale rousse avec les élytres un peu plus pâles, les antennes plus longues sont un peu rembrunies, les élytres ont une ponctuation plus dispersée et la taille dépasse 8 mill.

L. nigroverticalis n. sp. Sat minutus et latus, luteus, capite postice antennisque, articulo 1° excepto, nigris; thorace breve, pro parte distincte punctato; elytris, postice paulo attenuatis, diverse lineato-punctatis, antice vage depressis. Long. 4 mill. Brésil. — Voisin de *fulvina* Lac., plus pâle avec la tête bicolore.

L. bistrinotata n. sp. Minutus, sat latus, rufo-testaceus, antennis pro majore parte nigris, femoribus testaceis, nigro maculatis, tibiis rufis et nigris, tarsis nigris; thorace subquadrato, paulo strangulato; elytris antice impressis, diverse lineato-punctatis, in singulo antice ad humeros et ante medium nigro maculatis, externe, infra humeros, elongate nigro maculatis. Long. 5 mill. Brésil. — Caractérisé par son thorax à peine étranglé et les 3 macules noires des élytres triangulairement disposées.

L. dorsalis Ol. Plusieurs formes méritent d'être nom-

mées. Elytres avec une grande macule anteapicale foncée, soit avec 3 macules antérieures (disjonction de l'irrégulière unique typique), du Brésil (*var. mediosignata*), soit avec une macule premédiane discale foncée, de Montevideo (*var. medionotata*), ou élytres ayant seulement des macules externes foncées, soit trois (y compris l'humérale), de R. Janeiro (*var. trisignata*), soit deux, du Brésil (*var. bisignata*), soit ayant l'humérale seule, de Montevideo (*var. unisignata*).

L. minasensis n. sp. Latus, niger, elytris subviolaceis, thorace rufo, capite in vertice rufo bimaculato; elytris antice impresso-foveolatis, regulariter punctatis, postice substriatis; pedibus posticis sat robustis. Long. 4 mill. Brésil. — Peut se placer près de *Moritz* Lac.

L. viridiceps n. sp. Oblongus, niger, vertice elytrisque viridibus, thorace rufo, illo subquadrato; elytris parum latis, antice arcuate impressis, minute lineato punctatis. Long. 4 mill. Brésil. — Voisin de *nitidula* Lac. La *var. friburgoensis* a les élytres bleu-violacés plus robustes, munis d'une impression transversale peu profonde.

L. janeiroensis n. sp. Oblongus, sat curtus, niger, capite pro parte, thorace, articulo 1° antennarum femoribusque ad basin testaceis; antennis elongatis; elytris latis, sat brevibus, antice fortiter impressis, apice pro parte costatis. Long. 4,5 mill. Brésil. — A placer près de *pudens* Lac., tête moins foncée, base des fémurs testacée.

L. matasinhosa n. sp., du Brésil, de coloration analogue au précédent, un peu plus petit, a les tibia antérieurs teintés de roux, les élytres moins larges et faiblement bleutés, sont peu impressionnés en avant et plus nettement ponctués.



L. latior n. sp. Oblongo-subovatus, niger, thorace femoribusque ad basin minute rufo-testaceis ; antennis elongatis ; thorace breve et lato ; elytris latis, subsinuatis, apice attenuatis, antice mediocre impressis, pro parte sat fortiter punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — Dans son groupe, est très caractérisé par sa forme élargie.

L. rufobasalis n. sp. Oblongus, subparallelus, rufo-testaceus, elytris cyaneo-viridibus, ad basin in singulo rufo bimaculatis, maculis pro parte junctis, antennis, articulo 1° excepto, tibiis pro parte tarsisque nigris. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin de *basipennis* Lac., avec la coloration basale des élytres d'un roux testacé autrement disposée.

L. laterufa n. sp. Oblongus, rufus, elytris cyaneo-violaceis, labro, antennis, articulo 1° excepto, pectore, femoribus ad basin breve, tibiis tarsisque nigris, elytris subconvexis, antice minute impressis, minute lineato-punctatis. Long. 6 mill. Tucuman. — Diffère de *cruralis* Lac. par l'extrême base des cuisses noire, les élytres subconvexes.

L. pauloensis n. sp. Oblongus, parum latus, niger, elytris cyaneo-violaceis, capite, thorace scutelloque rubris ; thorace breve et lato ; elytris sat brevibus, antice breve impressis, lineato-punctatis, apice pro parte costulatis. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de *saphyrea* Lac., s'en distingue, à première vue, par les membres foncés.

L. Le Moulti n. sp. Oblongus, parum latus, rufo-testaceus, elytris cyaneis, antennis pro majeure parte, femoribus anticis apice, tibiis apice tarsisque pro majeure parte nigris ; thorace valde transverso ; elytris sat brevibus, antice fortiter impressis, pro majeure parte minute lineato-punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — A placer près de *azureipennis* Lac., coloration des pattes différente.

L. Clermonti n. sp. Oblongo-subelongatus, niger, elytris violaceo-cupreis ; antennis elongatis ; thorace ad basin minute multiplicato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, antice arcuate impressis, distincte et regulariter lineato-punctatis, apice substriatis ; pedibus gracilibus et elongatis. Long. 4 mill. Brésil. — A placer près de *cærulea* Lac.

L. paulopunctata n. sp. Oblongo-subelongatus, rufus, membris pro parte nigris, elytris viridibus ; thorace brève et lato ; elytris antice impressis, pro majore parte minutissime et sparse punctatis, apice extus bisulcatis. Long. 5 mill. Bogota. — Diffère de *azureipennis* Lac. par les élytres verts, autrement ponctués.

L. diversevittata n. sp. Oblongo-subparallelus, testaceus, antennis, articulo 1^o excepto, tibiis tarsisque nigris, elytris ad suturam, apice excepto, anguste vittatis, in singulo externe antice reducte nigro vittatis et postice nigro maculatis. Brésil. — Voisin de *sinuatotata* Cl.

L. baturitensis n. sp. Oblongus, testaceus, antennis, articulo 1^o excepto, nigris, elytris ad suturam et prela-teraliter cyaneo vittatis, vitta externa ad medium angustiora. Long. 4,5 mill. Brésil. — Diffère de *sinuatotata* Cl. par la forme moins robuste, la bande externe bleue et non oblique.

L. humerosignata n. sp. Minutus, sat latus, rufus, capite antice, antennis, pectore pedibusque pro majore parte nigris, femoribus diverse rufis, elytris ad humeros viride maculatis, his indistincte depressis. Long. 5 mill. Tucuman.

L. Gerardi n. sp., du Tucuman, de la taille du précédent, mais plus étroit, est testacé avec les antennes, moins le 1^{er} article, le sommet des fémurs ainsi que la moitié apicale des tibias et les tarses noirs.

L. annulicornis n. sp. Minutus, rufus, elytris testaceis, externe diverse piceo signatis, antice piceo foveolatis, membris testaceis, piceo-annulatis. Long. 3 mill. Brésil. — Voisin de *elaphrina* Lac. par la coloration des membres, mais celle du dessus du corps est différente.

L. annulimembris n. sp., du Brésil, à coloration analogue des membres, a le dessus du corps olivâtre bronzé avec le thorax teinté de roux et une macule rousse sur le front, le dessous du corps est en majeure partie flave.

L. nigromaculata n. sp. Minutus, subparallelus, rufus et testaceus, capite antice nigro notato, antennis nigris, apicem rufescentibus, geniculis brunneis, elytris ad humeros nigro maculatis, his antice paulo impressis, disperse punctatis. Long. 4 mill. B.-Ayres. — Peut se placer près de *Hogei* Jac.

Photinus lojaensis n. sp. [Lam.]. Oblongo-subovatus, niger, thorace late luteo marginato, elytris, apice excepto, ad suturam et prelateraliter late luteo vittatis; abdomine nigro, apice luteo notato. Long. 16 mill. Equateur. — Peut se placer près de *claricollis* Pic.

P. colombianus n. sp. Elongatus, niger, thorace externe arcuate luteo, elytris ad suturam et lateraliter, apice excepto, flavis, anguste brunneo marginatis. Long. 9 mill. Colombie. — Peut se placer près de *incertus* Pic.

P. pelotasensis n. sp., du Brésil, est moins allongé que le précédent, avec une coloration élytrale analogue, mais sans bordure brune externe; le thorax a deux macules discales pourprées et entre elles en avant un arc jaune.

P. subquadracollis n. sp. Elongatus, niger, thorace subquadrato, antice arcuato, flavo et rubro, postice me-

dio nigro notato, elytris lateraliter late albo vittatis, abdomine nigro, apice luteo. Long. 13 mill. Brésil. — Peut se placer près de *jucundus* E. Ol.

P. amazonicus n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, piceus, thorace flavo, in disco rubro et postice nigro trilobato, elytris piceis, lateraliter; ad medium latiore, luteo marginatis, pedibus testaceis, abdomine nigro, apice luteo. Long. 13 mill. Brésil. — Peut se placer près de *jucundus* E. Ol.

P. reductemarginalis n. sp. Oblongus, niger, thorace luteo et purpureo, ad medium nigro vittato et antice arcuate piceo marginato, elytris, postice excepto, late. ad suturam anguste, flavo marginatis et lateraliter medio flavo notatis, abdomine apice luteo. Long. 10 mill. Pérou. — Peut se placer près de *roseicollis* Bl.

P. Gounellei n. sp. Elongatus, niger, thorace antice luteo notato; elytris lateraliter anguste albo vittatis, abdomine luteo maculato. Long. 7 mill. Brésil. — Peut se placer près de *incertus* Pic.

P. hondurasus n. sp. Elongatus, subopacus, piceo-fuliginosus, thorace rubro, antice luteo, medio minute nigro, scutello rufo, elytris toto flavo marginatis, pedibus testaceis. Long. 7 mill. Honduras. — A placer près de *pulchellus* Gorh.

P. brevior n. sp., de Bolivie, est un peu plus court, avec le thorax moins large, et plus largement foncé au milieu, à peine teinté de rouge, la coloration élytrale moins foncée sur le disque et les pattes sont en partie claires.

P. obscurevittatus n. sp. Oblongus, flavus, pro parte brunnescens, thorace medio et postice late obscuro; elytris deplanatis, flavis, in disco vage vittato obscuris.

Long. 8 mill. Bolivie. — Forme des précédentes espèces, mais plus déprimé avec la coloration presque entièrement flave.

P. brunneovittatus n. sp. Oblongo-elongatus, late flavus, thorace flavo in disco rubro, elytris flavis, in disco late brunneo-griseo vittatis. Long. 8 mill. Costa-Rica. — Plus allongé et plus largement clair que *flavosuturalis* Pic.

P. pallidipes n. sp. Oblongo-elongatus, parum latus, late flavus ; thorace flavo, in disco piceo et rubro notato, elytris flavis, in disco ad suturam late, griseo brunnescente vittatis, abdomine ad basin nigro. Long. 12 mill. Brésil. — Plus grand que le précédent, avec le thorax plus large, tricolore.

P. flavonotatus n. sp. Oblongo-elongatus, brunnescens, pro parte piceus, thorace flavo, medio brunnescente, elytris brunneo-griseis, anguste flavo marginatis et ante medium externe flavo notatis ; abdomine piceo, apice flavo. Long. 10 mill. Colombie. — Peut se placer près de *marginipennis* Luc.

P. subinterruptus n. sp. Oblongo-subovatus, depressus, niger, thorace flavo, medio postice piceo, elytris fuscis, apice excepto, ad suturam et externe, lateraliter latiore, flavo-luteo limbatis, abdomine nigro, medio albo notato. Long. 7 mill. Pérou. — Peut se placer près de *interruptus* Er., coloration de l'abdomen différente.

P. marcapatanus n. sp. Oblongus, piceo-brunneus, thorace flavo, in disco piceo-brunnescente, elytris piceo-brunnescentibus, ad suturam et apice anguste, lateraliter latiore, flavo marginatis, pedibus pro maiore parte flavis. Long. 9 mill. Pérou. — Plus allongé que le précédent, avec l'apex des élytres clair.

M. PIC.





SciELO/MZUSP